

# 泌尿器科

## 尿路上皮がん

- 1 GEM+CBDCA
- 2 GC
- 3 GCショートハイドレーション
- 4 ペムブロリズマブ
- 5 GP
- 6 パドセブ(エンホルツマブベドチン)
- 7 アベルマブ単独

## 前立腺がん

- 8 DP
- 9 カバジタキセル+PSL

## 腎細胞がん

- 10 Nivolumab単独
- 11 ニボルマブ+イピリムマブ
- 12 キイトルーダ+レンバチニブ
- 13 キイトルーダ+アキシチニブ
- 14 アベルマブ+アキシチニブ

## 胚細胞腫瘍

- 15 BEP

(1) GEM+CBDCA

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day8	day15
RP1	グレースロンの点滴静注用3mgパック 100ml	1	袋						
	デキメタゾン注射液3.3mg	1	A	400mL/hr	○			○	○
RP2	アプレピタントカプセル (1日1回1カプセル3日分)	1	セット		○	○	○		
RP3	パロノセトロン点滴注パック 0.75mg50ml	1	袋	200mL/hr	○				
	デキメタゾン注射液3.3mg	3	A						
RP4	5%ブドウ糖液 100ml	1	本	30分	○			○	○
	ゲムシタピン注射用	1000	mg/ml						
RP5	生食250ml	1	袋	1時間	○				
	カルボチチン注射液	5	AUC						
RP6	生食50ml	1	本	フラッシュ	○	○		○	○

4週間ごと

(2) GC

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day8	day15
RP1	アプレピタントカプセル (1日1回1カプセル3日分)	1	セット		○	○	○		
RP2	生食50ml	1	本					○	○
	デキメタゾン注射液3.3mg	2	A	200mL/hr	○				
RP3	5%ブドウ糖液 100ml	1	本	30分	○			○	○
	ゲムシタピン注射用	1000	mg/ml						
RP4	生食50ml	1	本	フラッシュ	○			○	○
RP5	ソルデム3A輸液 500ml	1	袋	250mL/hr	○	○			
RP6	ラクテック注 500ml	1	袋	250mL/hr	○	○			
RP7	パロノセトロン点滴注パック 0.75mg50ml	1	袋	200mL/hr	○				
	デキメタゾン注射液3.3mg	3	A						
RP8	生食500ml	1	袋	2時間	○				
	シスプラチン注	70	mg/ml						
RP9	生食100ml	1	本	100mL/hr	○			○	○
	硫酸MG補正液 1mEq/ml 20ml	8	ml						
RP10	マンニトール注射液[20%] 300ml	1	本	150mL/hr	○				
RP11	ラクテック注 500ml	1	袋	250mL/hr	○				
RP12	ソルデム3A輸液 500ml	1	袋	250mL/hr	○				
RP13	ラクテック注 500ml	1	袋	250mL/hr	○				

4週間ごと

(3) GCショートハイドレーション

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day8	day15
RP1	アプレピタントカプセル (1日1回1カプセル3日分)	1	セット		○	○	○		
RP2	生食50ml	1	本					○	○
	デキメタゾン注射液3.3mg	2	A	200mL/hr	○				
RP3	5%ブドウ糖液 100ml	1	本	30分	○			○	○
	ゲムシタピン注射用	1000	mg/ml						
RP4	生食50ml	1	本	フラッシュ	○			○	○
RP5	ソルデム3A輸液 500ml	1	袋	500mL/hr	○				
RP6	パロノセトロン点滴注パック 0.75mg50ml	1	袋	200mL/hr	○				
	デキメタゾン注射液3.3mg	3	A						
RP7	生食500ml	1	袋	500mL/hr	○				
	シスプラチン注	70	mg/ml						
RP8	マンニトール注射液[20%] 300ml	1	本	300mL/hr	○				
RP9	ソルデム3A輸液 500ml	1	袋	500mL/hr	○				
	硫酸MG補正液 1mEq/ml 20ml	8	ml						

4週間ごと

(4) ベムプロリズマブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1	本 ルート確保・フラッシュ	○
RP2	生食100ml	1	本 30分	○
	ベムプロリズマブ点滴静注	200	mg インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1	本 フラッシュ	○

3週間ごと

(5) GP療法 (尿路上皮がん)							
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	ジフェンヒドラミン錠10mg		5 錠		○		
RP2	グレースロンの点滴静注用3mgバッグ 100ml		1 袋				
	デキサメタゾン注射液3.3mg		5 A	200mL/hr	○		
	ファモチジン注射液 20mg		1 A				
RP3	グレースロンの点滴静注用3mgバッグ 100ml		1 袋			○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A	400mL/hr			
RP4	5%ブドウ糖液 500ml		1 袋				
	バクシセル注		200 mg/㎡	3時間	○		
RP5	5%ブドウ糖液 100ml		1 本				
	ゲムシタピン注射用		1000 mg/㎡	30分	○	○	○
RP6	生食 50ml		1 本	フラッシュ	○	○	○

3週間ごと

(6) パドセブ (エンホルツマブベドチン)							
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食 50ml		1 本	フラッシュ	○	○	○
RP2	生食 100ml		1 本				
	注射用水100mL		1 本	30分	○	○	○
	エンホルツマブベドチン点滴静注用		1.25 mg/kg	インラインフィルター使用			
RP3	生食 50ml		1 本	フラッシュ	○	○	○

4週間ごと

(7) アベルマブ単独						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	ジフェンヒドラミン錠10mg		5 錠		○	
RP2	アセトアミノフェン錠 500		1 錠		○	
RP3	生食 50ml		1 本	フラッシュ	○	
RP4	生食 250ml		1 本	1時間		
	アベルマブ点滴静注		10 mg/kg	インラインフィルター使用	○	
RP5	生食 50ml		1 本	フラッシュ	○	

2週間ごと

(8) DP						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	グレースロンの点滴静注用3mgバッグ 100ml		1 袋			
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A	400mL/hr	○	
RP2	5%ブドウ糖液 250ml		1 袋			
	ドセタセル点滴静注		75 mg/㎡	1時間	○	
RP3	生食 50ml		1 本	フラッシュ	○	
経口	プレドニゾロン錠	1回5	mg	日2回 連日服用		

3週間ごと

(9) カバジタキセル+PSL						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	ジフェンヒドラミン錠10mg	5	T		○	
RP2	グレースロンの点滴静注用3mgバッグ 100ml	1	袋			
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2	A	400mL/hr	○	
	ファモチジン注射液 20mg	1	A			
RP3	生食 250ml	1	袋	1時間		
	カバジタキセル点滴静注	25	mg/㎡	インラインフィルター使用	○	
RP4	生食 50ml	1	本	フラッシュ	○	
経口	プレドニゾロン錠	1回5	mg	日2回 連日服用		

3週間ごと

(10) Nivolumab単独						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	生食 50ml	1	本	200mL/hr	○	
RP2	生食 100ml	1	本	200mL/hr		
	ニボルマブ点滴静注	240	mg	インラインフィルター使用	○	
RP3	生食 50ml	1	本	200mL/hr	○	

2週間ごと

(11) ニボルマブ+イビリムマブ					
薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	生食50ml	1	本	200mL/hr	○
RP2	生食100ml	1	本	200mL/hr	○
	ニボルマブ点滴静注	240	mg	インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1	本	100mL/hr	○
RP4	生食50ml (生食30ml抜いて20mlにする)	1	本	30分	○
	イビリムマブ点滴静注	1	mg/kg	インラインフィルター使用	
RP5	生食50ml	1	本	1時間	○

3週間ごと

(12) ペムプロリズマブ+レンパチニブ					
薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	生食50ml	1	本	フラッシュ	○
RP2	生食100ml	1	本	30分	○
	ペムプロリズマブ点滴静注	200	mg	インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1	本	フラッシュ	○
RP4	レンパチニブ	20	mg	1日1回 連日	○

3週間ごと

(13) ペムプロリズマブ+アキシチニブ					
薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	生食50ml	1	本	フラッシュ	○
RP2	生食100ml	1	本	30分	○
	ペムプロリズマブ点滴静注	200	mg	インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1	本	フラッシュ	○
RP4	アキシチニブ	5	mg	1日2回 連日	○

3週間ごと

(14) アベルマブ+アキシチニブ					
薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	ジフェンヒドラミン錠10mg	5	錠		○
RP2	アセトアミノフェン錠500	1	錠		○
RP3	生食50ml	1	本	フラッシュ	○
RP4	生食250ml	1	本	1時間	○
	アベルマブ点滴静注	10	mg/kg	インラインフィルター使用	
RP5	生食50ml	1	本	フラッシュ	○
RP6	アキシチニブ	5	mg	1日2回 連日	○

2週間ごと

(15) BEP												
薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	day9	day16		
RP1	アプレピタントカプセル (1日1回1カプセル3日分)	1	セット		○	○	○					
RP2	グラネキソ点滴静注用3mg/kg 100ml	1	袋									
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2	A	200mL/hr	○	○	○	○	○			
	ファモチジン注射液20mg	1	A									
RP3	生食50ml	1	本	200mL/hr						○	○	
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2	A									
RP4	生食50ml	1	本	フラッシュ		○				○	○	
RP5	生食100ml	1	本	250mL/hr		○				○	○	
	ブレオマイシン注射用	30	mg									
RP6	生食50ml	1	本	フラッシュ		○				○	○	
RP7	生食500ml	1	袋	2時間	○	○	○	○	○			
	エトポシド点滴静注	100	mg/m <sup>2</sup>									
RP8	生食500ml	1	袋	250mL/hr	○	○	○	○	○			
RP9	生食500ml	1	袋	2時間	○	○	○	○	○			
	シスプラチン注	20	mg/m <sup>2</sup>									
RP10	生食500ml	1	袋	250mL/hr	○	○	○	○	○			
RP11	マンニトール注射液[20%] 300ml	1	本	300mL/hr	○	○	○	○	○			
RP12	ソルデム3A輸液 500ml	1	袋	250mL/hr	○	○	○	○	○			

3週間ごと