

脳神経外科

悪性神経膠腫

- (1) BV 10mg/kg
- (2) BV 15mg/kg
- (3) テモゾロミド 150mg/m² (再発)
- (4) テモゾロミド 75mg/m² (初発)

(1) BV 10mg/kg (脳)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食100ml ペバシズマブ点滴静注用	10 mg/kg	1本	初回90分 2回目60分 回目を降30分	3 ○
RP2	生食50ml		1本	フラッシュ	○

2週間ごと

(2) BV 15mg/kg (脳)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食100ml ペバシズマブ点滴静注用	15 mg/kg	1本	初回90分 2回目60分 回目を降30分	3 ○
RP2	生食50ml		1本	フラッシュ	○

3週間ごと

(3) テモゾロミド 150mg/m² (再発)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	生食注シリンジ20ml		1本		○	○	○	○	○
RP2	生食250ml テモゾロミド点滴静注用	150 mg/m ²	1袋	90分 1Vを注射用水41mLで溶解	○	○	○	○	○
RP3	生食注シリンジ20ml		1本		○	○	○	○	○

テモゾロミド1日1回5日間投与し、23日間休薬。

(4) テモゾロミド 75mg/m² (初発)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	~	day42
RP1	生食注シリンジ20ml		1本		○	~	○
RP2	生食250ml テモゾロミド点滴静注用	75 mg/m ²	1袋	90分 1Vを注射用水41mLで溶解	○	~	○
RP3	生食注シリンジ20ml		1本		○	~	○

テモゾロミド1日1回42日間投与し、28日間休薬。