

歯科口腔外科

- 1 CTP(CDDP50mg)(口腔扁平上皮癌)
- 2 CTP(CDDP100mg)(口腔扁平上皮癌)

頭頸部がん

- 3 PTX+C-mab(初回)
- 4 PTX+C-mab(2回目以降)
- 5 CDDP+RT (3weekly)
- 6 ペムブロリズマブ+FP
- 7 アービタックス+RT (2回目以降)
- 8 アービタックス+RT (初回)
- 9 ペムブロリズマブ
- 10 ペムブロリズマブ+CBDCA+ 5 FU

(1) CTP(CDDP50mg)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3
RP1 アプレピタントカ [®] セル (1日1回1カ [®] セル3日分)	1	セット		○	○	○
RP2 ホスホマイシン 2 g 点滴静注	1	袋	200mL/hr メイン 9:30~10:00	○		
RP3 パロノセトロン点滴注 [®] 0.75mg50ml	1	袋	100mL/hr			
デキメタゾン注射液3.3mg	1	A	メイン	○		
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注 5mg	1	A	10:00~10:30			
RP4 セファランチン注 10mg 0.5% 2ml	1	A	トセキセル開始前に静 注 10:30	○		
RP5 ソルデム 3 A 輸液 200ml	1	袋	200mL/hr			
トセキセル点滴静注	30	mg/m ²	メイン	○		
RP6 ソルデム 3 A 輸液 500ml	1	袋	100mL/hr メイン 11:30~16:00	○		
RP7 ソルデム 3 A 輸液 200ml	1	袋	200mL/hr			
ペプロマイシン注	10	mg/m ²	メイン	○		
RP8 ホスホマイシン 2 g 点滴静注	1	袋	200mL/hr 側管1 16:30~17:00	○		
RP9 ソルデム 3 A 輸液 500ml	1	袋	56mL/hr メイン 17:00~2:00	○		
RP10 ソルデム 3 A 輸液 500ml	1	袋	56mL/hr メイン 2:00~10:00		○	
RP11 ソルデム 3 A 輸液 500ml	1	袋	167mL/hr メイン		○	
ファモチジン注射液 20mg	1	A	10:00~13:00			
RP12 マンニトール注射液[20%] 300ml	1	本	100mL/hr		○	
チオ硫酸ナトリウム注射液 2g	1	V	側管1			
RP13 ホスホマイシン 2 g 点滴静注	1	袋	200mL/hr 側管2 10:00~10:30		○	
RP14 生食 50ml	1	本	100mL/hr		○	
デキメタゾン注射液 1.65mg	1	A	側管2			
RP15 セファランチン注 10mg 0.5% 2ml	1	A	10:30		○	
RP16 シスプラチン注	50	mg	動注 10分かけて緩徐に 11:00		○	
RP17 チオ硫酸ナトリウム注射液 2g	3	V	シスプラチン動注後、緩徐 に静注 11:10		○	
RP18 ソルデム 3 A 輸液 500ml	1	袋	167mL/hr		○	
ファモチジン注射液 20mg	1	A	メイン			
RP19 マンニトール注射液[20%] 300ml	1	本	100mL/hr		○	
チオ硫酸ナトリウム注射液 2g	1	V	側管1			
RP20 ホスホマイシン 2 g 点滴静注	1	袋	200mL/hr 側管2 15:30~16:00		○	

1週間ごと

(2) CTP (CDDP100mg)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2
RP1	ホスホマイシン静注用2g		1 袋	30分 メイン	○	
	生食溶解液キットH100mL		1 キット	9:30~10:00		
RP2	パロノセトロン点滴注パック 0.75mg50m l		1 袋	120mL/hr		
	デキサメタゾン注射液3.3mg		1 A	メイン	○	
	d-クロロフェニラミンマレイン酸塩注 5 m g		1 A	10:00~10:30		
	アロカリス点滴静注235mg		1 瓶			
RP3	セファランチン注 1 0 mg 0. 5 % 2 ml		1 A	ドレサセル開始前に静注 10:30	○	
RP4	ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 ml		1 袋	1時間 メイン	○	
	ドレサセル点滴静注		30 mg/m ²	10:30~11:30		
RP5	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml		1 袋	5時間 メイン	○	
				11:30~16:00		
RP6	ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 ml		1 袋	1時間 メイン	○	
	ペプロマイシン注		10 mg/m ²	16:00~17:00		
RP7	ホスホマイシン静注用2g		1 袋	30分 側管1	○	
	生食溶解液キットH100mL		1 キット	16:30~17:00		
RP8	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml		1 袋	9時間 メイン	○	
				17:00~2:00		
RP9	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml		1 袋	9時間 メイン		○
				2:00~10:00		
RP10	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml		1 袋	3時間 メイン		○
	ファモチジン注射液 2 0 mg		1 A	10:00~13:00		
RP11	マンニトール注射液[20%] 300ml		1 本	3時間 側管1		○
	チオ硫酸ナトリウム注射液 2 g		1 V	動注1時間前 30分		
RP12	ホスホマイシン静注用2g		1 袋	側管2		○
	生食溶解液キットH100mL		1 キット	動注1時間前 100mL/hr		
RP13	生食 5 0 m l		1 本	側管2		○
	デキサメタゾン注射液1.65mg		1 A	動注30分前		
RP14	セファランチン注 1 0 mg 0. 5 % 2 ml		1 A	動注30分前		○
RP15	シスプラチン注		100 m g	動注 10分かけて緩徐に アンギオ室持参。シ スプラチン動注後、 3時間		○
RP16	チオ硫酸ナトリウム注射液 2 g		3 V	メイン		○
RP17	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml		1 袋	13:00~16:00		○
	ファモチジン注射液 2 0 mg		1 A	3時間 側管1		
RP18	マンニトール注射液[20%] 300ml		1 本	側管1		○
	チオ硫酸ナトリウム注射液 2 g		1 V	動注2時間後		
RP19	ホスホマイシン静注用2g		1 袋	30分 側管2		○
	生食溶解液キットH100mL		1 キット	動注4時間30分後		

1週間ごと

(3) PTX+Cetuximab : 初回

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食 5 0 m l	1	本		
	デキメタゾン注射液3.3mg	3	A		
	d-クロロフェニラミンマレイン酸塩注 5 m g	1	A	全開	○
	ファモチジン注射液 2 0 mg	1	A		
RP2	生食 2 5 0 m l	1	袋	2時間	○
	セツキシマブ注射液	400	mg/m ²		
RP3	生食 5 0 m l	1	本	100mL/hr	○
RP4	グレースロンの点滴静注用3mgパッゲ 100ml	1	袋	200mL/hr	○
RP5	生食 2 5 0 m l	1	袋	1時間	○
	パクリタール注	80	mg/m ²	インラインフィルター使用	
RP6	生食 5 0 m l	1	本	フラッシュ	○

初回

(4) PTX+Cetuximab : 2回目以降

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食 5 0 m l	1	本		
	デキメタゾン注射液3.3mg	3	A		
	d-クロロフェニラミンマレイン酸塩注 5 m g	1	A	全開	○
	ファモチジン注射液 2 0 mg	1	A		
RP2	生食 2 5 0 m l	1	袋	1時間	○
	セツキシマブ注射液	250	mg/m ²		
RP3	生食 5 0 m l	1	本	100mL/hr	○
RP4	グレースロンの点滴静注用3mgパッゲ 100ml	1	袋	200mL/hr	○
RP5	生食 2 5 0 m l	1	袋	1時間	○
	パクリタール注	80	mg/m ²	インラインフィルター使用	
RP6	生食 5 0 m l	1	本	フラッシュ	○

1週間ごと

(5) CDDP+RT

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	アプレピタントカプセル (1日1回1カプセル3日分)	1	セット			○	○	○	
RP2	パロノセトロン点滴注パッゲ 0.75mg50 m l	1	袋						
	デキメタゾン注射液3.3mg	3	A	200mL/hr		○			
RP3	生食 1 0 0 m l	1	本						
	デキメタゾン注射液3.3mg	2	A	200mL/hr			○	○	○
RP4	マンニトール注射液[20%] 300ml	1	本	300mL/hr		○			
RP5	生食 5 0 0 m l	1	袋						
	シスプラチン注	80	mg/m ²	2時間		○			
RP6	生食 1 0 0 m l	1	本						
	硫酸MG補正液 1 mEq/ml 20ml	8	ml	100mL/hr		○			
RP7	ラクテック注 5 0 0 ml	1	袋	83mL/hr	○	○	○		
RP8	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml	1	袋	83mL/hr	○	○	○		
RP9	ラクテック注 5 0 0 ml	1	袋	83mL/hr	○	○	○		
RP10	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml	1	袋	83mL/hr	○	○	○		

3週間ごと

(6) ペムプロリズマブ+FP

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	生食 50 ml		1 本	フラッシュ		○			
RP2	生食 100 ml		1 本	30分		○			
	ペムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用					
RP3	生食 50 ml		A	フラッシュ		○			
RP4	アプレピタント点滴静注用150mg	1 瓶		30分		○			
	生食 250 ml		1 袋						
RP5	パロノセトロン点滴注バッグ 0.75mg50ml	1 袋		200mL/hr		○			
	デキメタゾール注射液3.3mg	3 A							
RP6	ソルデム3 A 輸液 500 ml	1 袋		2時間		○			
	硫酸MG補正液 1 mEq/ml 20ml	8 ml							
RP7	マンニトール注射液[20%] 300ml	1 瓶		1時間		○			
RP8	生食 500 ml		1 袋	2時間		○			
	シブリン注	100 mg/m ²							
RP9	ソルデム3 A 輸液 500 ml	1 袋		4日間持続		○	○	○	○
	5FU注	1000 mg/m ²							
RP10	ソルデム3 A 輸液 500 ml	1 袋		2時間		○	○	○	○
RP11	フィジオ140輸液	1 袋		2時間		○	○	○	○
RP12	ソルデム3 A 輸液 500 ml	1 袋		2時間	○				
RP13	フィジオ140輸液	1 袋		2時間	○				
RP14	ソルデム3 A 輸液 500 ml	1 袋		2時間	○				
RP15	フィジオ140輸液	1 袋		2時間	○				

3週間ごと

(7) アービタックス+RT (初回)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食 50 ml		1 本		○
	デキメタゾール注射液3.3mg	2 A		100mL/hr	
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注 5 mg	1 A			
RP2	セツキシマブ注射液	400 mg/m ²		2時間	○
	生食 250 ml		1 袋		
RP3	生食 50 ml		1 本	フラッシュ	○

1週間ごと

(8) アービタックス+RT (2回目以降)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食 50 ml		1 本		○
	デキメタゾール注射液3.3mg	2 A		100mL/hr	
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注 5 mg	1 A			
RP2	セツキシマブ注射液	250 mg/m ²		2時間	○
	生食 250 ml		1 袋		
RP3	生食 50 ml		1 本	フラッシュ	○

1週間ごと

(9) ペムプロリズマブ

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食 50 ml		1 本	ルート確保・フラッシュ	○
RP2	生食 100 ml		1 本	30分	○
	ペムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用	
RP3	生食 50 ml		1 本	フラッシュ	○

3週間ごと

(10) ベムプロリズマブ+CBDCA+5FU

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4
RP1	生食 50 ml		1 本	フラッシュ	○			
RP2	生食 100 ml		1 本	30分	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用				
RP3	生食 50 ml		1 本	フラッシュ	○			
RP4	パロノセトロン点滴注バッグ 0.75mg50ml		1 袋					
	デキメタゾン注射液3.3mg		3 A	120mL/hr	○			
	アロカリス点滴静注235mg		1 瓶					
RP5	生食 250 ml		1 袋	60分	○			
	カルボプラチン注射液		5 AUC					
RP6	生食 50 ml		1 本	フラッシュ	○			
RP7	ソルデム 3 A 輸液 500 ml		1 袋	持続	○	○	○	○
	5FU注		1000 mg/m ²					

3週間ごと