

乳腺・呼吸器外科

- (1) dose dense EC 【dose dense EC→パクリタキセル】
- (2) dose dense パクリタキセル 【dose dense EC→パクリタキセル】
- (3) EC (エピルビシン+シクロホスファミド)
- (4) FEC75 (フルオロウラシル+エピルビシン+シクロホスファミド)
- (5) FEC100
- (6) アテゾリズマブ+パクリタキセル (アルブミン懸濁型)
- (7) エリブリン
- (8) ゲムシタビン
- (9) ドセタキセル (60mg/m²)
- (10) ドセタキセル (75mg/m²)
- (11) トラスツズマブ エムタンシン
- (12) トラスツズマブ デルクステカン
- (13) トラスツズマブ (初回)
- (14) トラスツズマブ (2回目以降)
- (15) パクリタキセル (初回)
- (16) パクリタキセル (2回目以降)
- (17) パクリタキセル+トラスツズマブ (初回)
- (18) パクリタキセル+トラスツズマブ (2回目以降)
- (19) パクリタキセル+ベバシズマブ
- (20) ビノレルビン
- (21) ペムブロリズマブ (術後)
- (22) ペムブロリズマブ+EC (術前)
- (23) ペムブロリズマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン
- (24) ペムブロリズマブ+パクリタキセル
- (25) ペムブロリズマブ+パクリタキセル (アルブミン懸濁型)
- (26) ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン (術前)
- (27) ペルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注 (初回)
- (28) ペルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注 (2回目以降)
- (29) ペルツズマブ+トラスツズマブ (初回)
- (30) ペルツズマブ+トラスツズマブ (2回目以降)
- (31) ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル (初回)
- (32) ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル (2回目以降)
- (33) ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル (初回)
- (34) ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル (2回目以降)

(1) dose dense EC 【dose dense EC→パクリタキセル】

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 3 A 1 瓶	30分	○
RP2	生食100ml エピルピシン塩酸塩注射液	1 本 90 mg/ml	15分	○
RP3	生食250ml シクロフォスファミド (注射用)	1 本 600 mg/ml	30分	○
RP4	生食50ml	1 本	777777	○

2週間ごとに4回投与。その後【dose dense EC後のPTX】へ

(2) dose dense パクリタキセル 【dose dense EC→パクリタキセル】

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	クラニセトロン点滴静注3mgバッグ デキサメタゾン注射液3.3mg ファモチジン注射液20mg	1 袋 3 A 1 A	30分	○
RP2	生食500ml パクリタキセル注	1 袋 175 mg/ml	3時間 インハイ777777-使用	○
RP3	生食50ml	1 本	777777	○
経口	ジフェンヒドราม錠10mg	5 錠		○

2週間ごとに4回投与

(3) EC

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 3 A 1 瓶	30分	○
RP2	生食100ml エピルピシン塩酸塩注射液	1 本 90 mg/ml	15分	○
RP3	生食100ml シクロフォスファミド (注射用)	1 本 600 mg/ml	30分	○
RP4	生食50ml	1 本	777777	○

3週間ごと

(4) FEC75

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 3 A 1 瓶	30分	○
RP2	生食100ml エピルピシン塩酸塩注射液	1 本 75 mg/ml	15分	○
RP3	生食250ml シクロフォスファミド (注射用) フルオロウラシル	1 袋 500 mg/ml 500 mg/ml	1時間	○
RP4	生食50ml	1 本	777777	○

3週間ごと

(5) FEC100

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 3 A 1 瓶	30分	○
RP2	生食100ml エピルピシン塩酸塩注射液	1 本 100 mg/ml	15分	○
RP3	生食250ml シクロフォスファミド (注射用) フルオロウラシル	1 袋 500 mg/ml 500 mg/ml	1時間	○
RP4	生食50ml	1 本	777777	○

3週間ごと

(6) アテゾリズマブ+パクリタキセル (アルブミン懸濁型)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml	1 本	777777	○		○
RP2	生食100ml アテゾリズマブ点滴静注	1 本 840 mg	初回1時間、2回目以降30分 インハイ777777-使用	○		○
RP3	生食50ml	1 本	777777	○		○
RP4	生食50ml デキサメタゾン注射液3.3mg	1 本 2 A	15分	○	○	○
RP5	生食100ml パクリタキセル (アルブミン懸濁型) 点滴静注	1 袋 100 mg/ml	30分	○	○	○
RP6	生食50ml	1 本	777777	○	○	○

2週間ごと

(7) エリブリン						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8
RP1	生食50ml		1 本			
	デキサメタゾン注射液3.3mg		1 A	15分	○	○
RP2	生食50ml		1 本			
	エリブリン静注用		1.4 mg/m ²	6分	○	○
RP3	生食50ml		1 本	フラスコ	○	○

3週間ごと

(8) ゲムシタピン						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8
RP1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	15分	○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A			
RP2	5%ブドウ糖液100ml		1 本	30分	○	○
	ゲムシタピン注射用		1250 mg/m ²			
RP3	生食50ml		1 本	フラスコ	○	○

3週間ごと

(9) ドセタキセル(60mg/m ²)						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	15分	○	
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A			
RP2	生食250ml		1 袋	1時間	○	
	ドセタキセル点滴静注		60 mg/m ²			
RP3	生食50ml		1 本	フラスコ	○	

3週間ごと

(10) ドセタキセル(75mg/m ²)						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	15分	○	
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A			
RP2	生食250ml		1 袋	1時間	○	
	ドセタキセル点滴静注		75 mg/m ²			
RP3	生食50ml		1 本	フラスコ	○	

3週間ごと

(11) トラスツズマブ エムタンシン						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	生食50ml		1 本	フラスコ	○	
RP2	生食250ml		1 袋	初回1時間30分、2回目以降30分	○	
	トラスツズマブ エムタンシン点滴静注用		3.6 mg/kg	インハイフイスター使用		
RP3	生食50ml		1 本	フラスコ	○	

3週間ごと

(12) トラスツズマブ デルクステカン							
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3
RP1	パロノセロン点滴注バッグ0.75mg		1 袋				
	デキサメタゾン注射液3.3mg		3 A	30分	○		
	アロカリス点滴静注235mg		1 瓶				
RP2	5%ブドウ糖液100ml		1 本	フラスコ	○		
RP3	5%ブドウ糖液100ml		1 本	初回1時間30分			
	トラスツズマブ デルクステカン		5.4 mg/kg	2回目以降30分	○		
	注射用水100ml		1 本	溶解用			
RP4	5%ブドウ糖液100ml		1 本	フラスコ	○		

3週間ごと

(13) トラスツズマブ (初回)						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	
RP1	生食50ml		1 本	フラスコ	○	
RP2	生食250ml		1 袋	1時間30分	○	
	トラスツズマブ塩酸塩注射液		8 mg/kg			
	注射用水	必要量		トラスツズマブ 溶解用		
RP3	生食50ml		1 本	フラスコ	○	

3週間ごと

(14) トラスズマブ (2回目以降)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本	フック	○
RP2	生食250ml		1 袋	30分	○
	トラスズマブ塩酸塩注射液		6 mg/kg		
	注射用水	必要量		トラスズマブ 溶解用	
RP3	生食50ml		1 本	フック	○

3週間ごと

(15) バクリタキセル (初回)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋		○
	デキサメタゾン注射液3.3mg		5 A	30分	
	ファモチジン注射液20mg		1 A		
RP2	5%ブドウ糖液250ml		1 袋	1時間	○
	バクリタキセル注		80 mg/m ²	インフュージョン使用	
RP3	生食50ml		1 本	フック	○
経口	レスタミンコーワ錠10mg		5 T		○

3週間ごと

(16) バクリタキセル (2回目以降)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	ソルデム3A輸液200ml		1 袋		○
	デキサメタゾン注射液3.3mg		1 A	1時間	
	ファモチジン注射液20mg		1 A		
RP2	5%ブドウ糖液250ml		1 袋	1時間	○
	バクリタキセル注		80 mg/m ²	インフュージョン使用	
RP3	生食50ml		1 本	フック	○
経口	レスタミンコーワ錠10mg		5 T		○

1週間ごと

(17) バクリタキセル+トラスズマブ (初回)							
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml		1 本		○	○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg		5 A	全開			
	ファモチジン注射液20mg		1 A				
RP2	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	30分	○	○	○
RP3	5%ブドウ糖液250ml		1 袋	1時間	○	○	○
	バクリタキセル注		80 mg/m ²	インフュージョン使用			
RP4	生食50ml		1 本	フック	○	○	○
RP5	生食250ml		1 袋	1時間30分	○		
	トラスズマブ塩酸塩注射液		4 mg/kg				
	注射用水	必要量		トラスズマブ 溶解用			
RP6	生食50ml		1 本	フック	○		
経口	レスタミンコーワ錠10mg		5 T		○	○	○

バクリタキセルは毎週投与
トラスズマブは3週間ごと

(18) バクリタキセル+トラスツズマブ+トラスツズマブ (2回目以降)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml	1 本				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	1 A	全開	○	○	○
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
RP2	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋	30分	○	○	○
RP3	5%ブドウ糖液250ml	1 袋	1時間	○	○	○
	バクリタキセル注	80 mg/ml	インラインフィルター使用			
RP4	生食50ml	1 本	フラスコ	○	○	○
RP5	生食250ml	1 袋	30分			
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	2 mg/kg		○		
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用			
RP6	生食50ml	1 本	フラスコ	○		
経口	レスタミンコーワ錠10mg	5 T		○	○	○

バクリタキセルは毎週投与
トラスツズマブは3週間ごと

(19) バクリタキセル+ペバシズマブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml	1 本				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A	15分	○	○	○
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
RP2	生食50ml	1 袋	30分	○	○	○
RP3	生食250ml	1 袋	1時間	○	○	○
	バクリタキセル注	90 mg/ml	インラインフィルター使用			
RP4	生食50ml	1 本	フラスコ	○	○	○
RP5	生食100ml	1 本	初回1時間30分、2回目1時間、	○		
	ペバシズマブ点滴静注用	10 mg/kg	3回目以降30分	○		
RP6	生食50ml	1 本	フラスコ	○		
経口	レスタミンコーワ錠10mg	5 T		○	○	○

4週間ごと

(20) ビノレルビン

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8
RP1	生食250ml	1 本	1時間 6-11-7、フラスコ	○	○
RP2	生食50ml	1 本	10分	○	○
	ビノレルビン静注液	25 mg/ml			

3週間ごと

(21) ベムプロロシズマブ (術後)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1 本	フラスコ	○
RP2	生食100ml	1 本	30分	○
	ベムプロロシズマブ点滴静注	200 mg	インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1 本	フラスコ	○

3週間ごと

(22) ベムプロリズマブ+EC (術前)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本	75ml/分	○
RP2	生食100ml		1 本	30分	○
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml		1 本	75ml/分	○
RP4	パロノセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A		30分	○
	アロカリス点滴静注235mg		1 瓶		
RP5	生食100ml		1 本	15分	○
	エビルピシン塩酸塩注射液	90 mg/ml			
RP6	生食100ml		1 本	30分	○
	シクロフォスファミド (注射用)	600 mg/ml			
RP7	生食50ml		1 本	75ml/分	○

3週間ごと

(23) ベムプロリズマブ+ゲムシタピン+カルボプラチン						
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8
RP1	生食50ml		1 本	75ml/分	○	
RP2	生食100ml		1 本	30分	○	
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用		
RP3	生食50ml		1 本	75ml/分	○	
RP4	グラネセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋		○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		30分		
RP5	5%ブドウ糖液100ml		1 本	30分	○	○
	ゲムシタピン注射用	1000 mg/ml				
RP6	生食250ml		1 袋	1時間	○	○
	カルボプラチン注射液	2 AUC				
RP7	生食50ml		1 本	75ml/分	○	○

3週間ごと

(24) ベムプロリズマブ+バクリタキセル							
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml		1 本	75ml/分	○		
RP2	生食100ml		1 本	30分	○		
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用			
RP3	生食50ml		1 本	75ml/分	○		
RP4	グラネセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		30分			
	ファモチジン注射液20mg	1 A			○	○	○
	d-クルルフェニラミンマレイン酸塩5mg	1 A					
RP5	生食250ml		1 袋	1時間	○	○	○
	バクリタキセル注	90 mg/ml		インラインフィルター使用			
RP6	生食50ml		1 本	75ml/分	○	○	○

ベムプロリズマブは3週間ごと
バクリタキセルは4週間ごと

(25) ベムプロリズマブ+バクリタキセル (アルブミン懸濁型)							
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml		1 本	75ml/分	○		
RP2	生食100ml		1 本	30分	○		
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用			
RP3	生食50ml		1 本	75ml/分	○		
RP4	生食50ml		1 本	15分	○	○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A					
RP5	生食100ml		1 袋	30分	○	○	○
	バクリタキセル (アルブミン懸濁型) 点滴静注用	100 mg/ml					
RP6	生食50ml		1 本	75ml/分	○	○	○

ベムプロリズマブは3週間ごと
バクリタキセル (アルブミン懸濁型) は4週間ごと

(26) ベムプロリズマブ+バクリタキセル+カルボプラチン (術前)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml	1 本	77℃	○		
RP2	生食100ml	1 本	30分	○		
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg	インラインフィルター使用			
RP3	生食50ml	1 本	77℃	○		
RP4	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A				
	ファモチジン注射液20mg	1 A	30分	○	○	○
	d-クルロフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A				
	アロカリス点滴静注235mg	1 瓶				
RP5	生食250ml	1 袋	1時間	○		
	バクリタキセル注	80 mg/ml	インラインフィルター使用			
RP6	生食250ml	1 袋	1時間	○	○	○
	カルボプラチン注射液	5 AUC				
RP7	生食50ml	1 本	77℃	○	○	○

3週間ごと

(27) ベルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注 (初回)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	ベルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注IN	15 mg	8分かけて 大腿部に皮下投与	○

3週間ごと

(28) ベルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注 (2回目以降)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	ベルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注MA	10 mg	5分かけて 大腿部に皮下投与	○

3週間ごと

(29) ベルツズマブ+トラスツズマブ (初回)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食250ml	1 袋	1時間	○
	ベルツズマブ点滴静注	840 mg		
RP2	生食50ml	1 本	1時間	○
RP3	生食250ml	1 袋	1時間30分	○
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	8 mg/kg		
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用	
RP4	生食50ml	1 本	77℃	○

3週間ごと

(30) ベルツズマブ+トラスツズマブ (2回目以降)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食250ml	1 袋	30分	○
	ベルツズマブ点滴静注	420 mg		
RP2	生食50ml	1 本	30分	○
RP3	生食250ml	1 袋	30分	○
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	6 mg/kg		
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用	
RP4	生食50ml	1 本	77℃	○

3週間ごと

(31) ベルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル (初回)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋		
	d-クルロフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A	30分	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		
RP2	生食250ml	1 袋	1時間	○
	ドセタキセル点滴静注	75 mg/ml		
RP3	生食50ml	1 本	77℃	○
RP4	生食250ml	1 袋	1時間	○
	ベルツズマブ点滴静注	840 mg		
RP5	生食50ml	1 本	1時間	○
RP6	生食250ml	1 袋	1時間30分	○
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	8 mg/kg		
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用	
RP7	生食50ml	1 本	77℃	○

3週間ごと

(32) ベルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル (2回目以降)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋		
	d-クルルフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A	30分	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		
RP2	生食250ml	1 袋	1時間	○
	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²		
RP3	生食50ml	1 本	75ml/30分	○
RP4	生食250ml	1 袋	30分	○
	ベルツズマブ点滴静注	420 mg		
RP5	生食50ml	1 本	30分	○
RP6	生食250ml	1 袋	30分	○
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	6 mg/kg		○
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用	
RP7	生食50ml	1 本	75ml/30分	○

3週間ごと

(33) ベルツズマブ+トラスツズマブ+バクリタキセル (初回)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋				
	d-クルルフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A	30分	○		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A				
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
RP2	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋				
	d-クルルフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A	30分		○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	1 A				
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
RP3	生食250ml	1 袋	1時間	○	○	○
	バクリタキセル注	80 mg/m ²	インラインフィルター使用			
RP4	生食50ml	1 本	75ml/30分	○	○	○
RP5	生食250ml	1 袋	1時間	○		
	ベルツズマブ点滴静注	840 mg				
RP6	生食50ml	1 本	30分	○		
RP7	生食250ml	1 袋	1時間30分	○		
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	8 mg/kg				
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用			
RP8	生食50ml	1 本	75ml/30分	○		

3週間ごと

(34) ベルツズマブ+トラスツズマブ+バクリタキセル (2回目以降)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋				
	d-クルルフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A	30分	○		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A				
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
RP2	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1 袋				
	d-クルルフェニラミンマレイン酸塩注5mg	1 A	30分		○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	1 A				
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
RP3	生食250ml	1 袋	1時間	○	○	○
	バクリタキセル注	80 mg/m ²	インラインフィルター使用			
RP4	生食50ml	1 本	75ml/30分	○	○	○
RP5	生食250ml	1 袋	30分	○		
	ベルツズマブ点滴静注	420 mg				
RP6	生食50ml	1 本	30分	○		
RP7	生食250ml	1 袋	30分	○		
	トラスツズマブ塩酸塩注射液	6 mg/kg				
	注射用水	必要量	トラスツズマブ 溶解用			
RP8	生食50ml	1 本	75ml/30分	○		

3週間ごと