

泌尿器科

尿路上皮がん

- (1) GC (ゲムシタビン+シスプラチン)
- (2) GC (ショートハイドレーション)
- (3) GP (ゲムシタビン+パクリタキセル)
- (4) アベルマブ
- (5) エンホルツマブ ベドチン
- (6) ゲムシタビン+カルボプラチン
- (7) ペムブロリズマブ

前立腺がん

- (8) カバジタキセル
- (9) ドセタキセル

腎細胞がん

- (10) アベルマブ+アキシチニブ
- (11) ニボルマブ
- (12) ニボルマブ+イピリムマブ
- (13) ニボルマブ+カボザンチニブ
- (14) ペムブロリズマブ+アキシチニブ
- (15) ペムブロリズマブ+レンバチニブ

胚細胞腫瘍

- (16) BEP (ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチン)

(1) GC

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day8	day15
RP1	生食50ml	1本	15分	○				○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2A							
RP2	5%ブドウ糖液100ml	1本	30分	○				○	○
	ゲムシタピン注射用	1000 mg/ml							
RP3	生食50ml	1本	フラスコ	○				○	○
RP4	ソルデム3A輸液500ml	1袋	2時間		○	○			
RP5	ラクテック注500ml	1袋	2時間		○	○			
RP6	パロノセトロン点滴バッグ0.75mg	1袋							
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3A	30分		○				
	アロカリス点滴静注235mg	1瓶							
RP7	生食500ml	1袋	2時間		○				
	シスプラチン注	70 mg/ml							
RP8	生食100ml	1本	1時間		○				
	硫酸mg補正液1mEq/ml 20ml	8 ml							
RP9	マンニトール注射液[20%] 300ml	1本	2時間		○				
RP10	ラクテック注500ml	1袋	2時間		○				
RP11	ソルデム3A輸液500ml	1袋	2時間		○				
RP12	ラクテック注500ml	1袋	2時間		○				

4週間ごと

(2) GC (ショートハイドレーション)

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day8	day15
RP1	生食50ml	1本	15分	○		○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2A					
RP2	5%ブドウ糖液100ml	1本	30分	○		○	○
	ゲムシタピン注射用	1000 mg/ml					
RP3	生食50ml	1本	フラスコ	○		○	○
RP4	ソルデム3A輸液500ml	1袋	1時間		○		
RP5	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg	1袋					
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3A	30分		○		
	アロカリス点滴静注235mg	1瓶					
RP6	生食500ml	1袋	1時間		○		
	シスプラチン注	70 mg/ml					
RP7	マンニトール注射液[20%] 300ml	1本	1時間		○		
RP8	ソルデム3A輸液500ml	1袋	1時間		○		
	硫酸mg補正液1mEq/ml 20ml	8 ml					

4週間ごと

(3) GP

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1袋				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	5A	30分	○		
	ファモチジン注射液20mg	1A				
RP2	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1袋			○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2A	15分			
RP3	5%ブドウ糖液500ml	1袋	3時間	○		
	バクリタキセル注	200 mg/ml				
RP4	5%ブドウ糖液100ml	1本	30分	○	○	○
	ゲムシタピン注射用	1000 mg/ml				
RP5	生食50ml	1本	フラスコ	○	○	○
経口	ジフェンヒドラミン錠10mg	5錠		○		

3週間ごと

(4) アベルマブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1本	フラスコ	○
RP2	生食250ml	1本	1時間	○
	アベルマブ点滴静注	10 mg/kg	インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1本	フラスコ	○
経口	ジフェンヒドラミン錠10mg	5錠		○
経口	アセトアミノフェン錠500mg	1錠		○

2週間ごと

(5) エンホルツマブ ベドチン

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day8	day15
RP1	生食50ml	1本	フラスコ	○	○	○
RP2	生食100ml	1本	30分			
	注射用水100mL	1本		○	○	○
	エンホルツマブ ベドチン点滴静注用	1.25 mg/kg				
RP3	生食50ml	1本	フラスコ	○	○	○

4週間ごと

(6) ゲムシタピン+カルボプラチン

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day8	day15
RP1	生食100ml	1 袋	30分	○		○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	1 A					
RP2	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg	1 袋					
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A	30分		○		
	アロカリス点滴静注235mg	1 瓶					
RP3	5%ブドウ糖液100ml	1 本	30分	○		○	○
	ゲムシタピン注射用	1000 mg/ml					
RP4	生食250ml	1 袋	1時間		○		
	カルボプラチン注射液	5 AUC					
RP5	生食50ml	1 本	フラッシュ	○	○	○	○

4週間ごと

(7) ベムプロリズマブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1 本	ルート確保・フラッシュ	○
RP2	生食100ml	1 本	30分	○
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg	インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml	1 本	フラッシュ	○

3週間ごと

(8) カバジタキセル

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ	1 袋		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A	15分	○
	ファモチジン注射液20mg	1 A		
RP2	生食250ml	1 袋	1時間	
	カバジタキセル点滴静注	25 mg/ml	インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml	1 本	フラッシュ	○
経口	ジフェンヒドรามミン錠10mg	5 T		○
経口	ブレドニゾン錠	1回5 mg	1日2回 連日服用	

3週間ごと

(9) ドセタキセル

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ	1 袋		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A	15分	○
RP2	5%ブドウ糖液250ml	1 袋	1時間	
	ドセタキセル点滴静注	75 mg/ml		○
RP3	生食50ml	1 本	フラッシュ	○
経口	ブレドニゾン錠	1回5 mg	1日2回 連日服用	

3週間ごと

(10) アベルマブ+アキシチニブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1 本	フラッシュ	○
RP2	生食250ml	1 本	1時間	
	アベルマブ点滴静注	10 mg/kg	インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml	1 本	フラッシュ	○
経口	アキシチニブ	5 mg	1日2回 連日	○
経口	ジフェンヒドรามミン錠10mg	5 錠		○
経口	アセトアミノフェン錠500mg	1 錠		○

2週間ごと

(11) ニボルマブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1 本	フラッシュ	○
RP2	生食100ml	1 本	30分	
	ニボルマブ点滴静注	240 mg	インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml	1 本	フラッシュ	○

2週間ごと

(12) ニボルマブ+イピリムマブ

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml	1 本	15分	○
RP2	生食100ml	1 本	30分	
	ニボルマブ点滴静注	240 mg	インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml	1 本	30分	○
RP4	生食50ml (生食30mL抜いて20mLにする)	1 本	30分	○
	イピリムマブ点滴静注	1 mg/kg	インラインフィルター使用	
RP5	生食50ml	1 本	1時間	○

3週間ごと

(13) ニボルマブ+カボザンチニブ					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1本	フラスコ	○
RP2	生食100ml		1本	30分	○
	ニボルマブ点滴静注	240 mg		インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml		1本	フラスコ	○
経口	カボザンチニブ	60 mg		1日1回 連日	○

3週間ごと

(14) ベムプロリズマブ+アキシチニブ					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1本	フラスコ	○
RP2	生食100ml		1本	30分	○
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml		1本	フラスコ	○
経口	アキシチニブ	5 mg		1日2回 連日	○

3週間ごと

(15) ベムプロリズマブ+レンパチニブ					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1本	フラスコ	○
RP2	生食100ml		1本	30分	○
	ベムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用	○
RP3	生食50ml		1本	フラスコ	○
経口	レンパチニブ	20 mg		1日1回 連日	○

3週間ごと

(16) BEP											
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	day9	day16
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ		1袋								
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A	30分	○	○	○	○	○		
	ファモチジン注射液20mg		1 A								
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶								
RP2	生食50ml		1本	15分						○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A								
RP3	生食50ml		1本	フラスコ		○				○	○
RP4	生食100ml		1本	24分		○				○	○
	プレオマイシン注射用	30 mg									
RP5	生食50ml		1本	フラスコ		○				○	○
RP6	生食500ml		1袋	2時間	○	○	○	○	○		
	エトポシド点滴静注	100 mg/m ²									
RP7	生食500ml		1袋	2時間	○	○	○	○	○		
RP8	生食500ml		1袋	2時間	○	○	○	○	○		
	シスプラチン注	20 mg/m ²									
RP9	生食500ml		1袋	2時間	○	○	○	○	○		
RP10	マンニトール注射液[20%] 300ml		1本	1時間	○	○	○	○	○		
RP11	ソルデム3A輸液500ml		1袋	2時間	○	○	○	○	○		

3週間ごと