

# 脳神経外科

## 悪性神経膠腫

- (1) テモゾロミド (150mg/m<sup>2</sup>)
- (2) テモゾロミド (75mg/m<sup>2</sup>)
- (3) ベバシズマブ (10mg/kg)
- (4) ベバシズマブ (15mg/kg)

### (1) テモゾロミド (150mg/m<sup>2</sup>)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	生食注シリンジ20ml		1本	フラッシュ	○	○	○	○	○
RP2	生食250ml		1袋	1時間30分	○	○	○	○	○
	テモゾロミド点滴静注用	150 mg/m <sup>2</sup>		1Vを注射用水41mLで溶解					
RP3	生食注シリンジ20ml		1本	フラッシュ	○	○	○	○	○

1日1回5日間投与し、23日間休薬。

### (2) テモゾロミド (75mg/m<sup>2</sup>)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	～	day42
RP1	生食注シリンジ20ml		1本	フラッシュ	○	～	○
RP2	生食250ml		1袋	1時間30分	○	～	○
	テモゾロミド点滴静注用	75 mg/m <sup>2</sup>		1Vを注射用水41mLで溶解			
RP3	生食注シリンジ20ml		1本	フラッシュ	○	～	○

1日1回42日間投与し、28日間休薬。

### (3) ベバシズマブ (10mg/kg)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食100ml		1本	初回1時間30分 2回目1時間	○
	ベバシズマブ点滴静注用	10 mg/kg		3回目以降30分	
RP2	生食50ml		1本	フラッシュ	○

2週間ごと

### (4) ベバシズマブ (15mg/kg)

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食100ml		1本	初回1時間30分 2回目1時間	○
	ベバシズマブ点滴静注用	15 mg/kg		3回目以降30分	
RP2	生食50ml		1本	フラッシュ	○

3週間ごと