

歯科口腔外科

口腔扁平上皮がん

- (1) CTP (CDDP50mg)
- (2) CTP (CDDP100mg)

頭頸部がん

- (3) シスプラチン+放射線併用
- (4) セツキシマブ+放射線併用 (初回)
- (5) セツキシマブ+放射線併用 (2回目以降)
- (6) パクリタキセル+セツキシマブ (初回)
- (7) パクリタキセル+セツキシマブ (2回目以降)
- (8) ペムブロリズマブ
- (9) ペムブロリズマブ+フルオロウラシル+カルボプラチン
- (10) ペムブロリズマブ+フルオロウラシル+シスプラチン

(1) CTP (CDDP50mg)		投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2
RP1	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL		1 袋 1 キット	30分 メイン	○	
RP2	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg アロカリス点滴静注235mg		1 袋 1 A 1 A 1 瓶	30分 メイン 10:00~10:30	○	
RP3	セファランチン注10mg		1 A	ドセタキセル開始前に静注 10:30	○	
RP4	ソルデム3A輸液200ml ドセタキセル点滴静注		1 袋 30 mg/ml	1時間 メイン	○	
RP5	ソルデム3A輸液500ml		1 袋	5時間 メイン 11:30~16:00	○	
RP6	ソルデム3A輸液200ml ペプロマイシン注		1 袋 10 mg/ml	1時間 メイン	○	
RP7	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL		1 袋 1 キット	30分 側管1	○	
RP8	ソルデム3A輸液500ml		1 袋	9時間 メイン 17:00~2:00	○	
RP9	ソルデム3A輸液500ml		1 袋	9時間 メイン 2:00~10:00		○
RP10	ソルデム3A輸液500ml ファモチジン注射液20mg		1 袋 1 A	3時間 メイン 10:00~13:00		○
RP11	マンニトール注射液[20%] 300ml チオ硫酸ナトリウム注射液2g		1 本 1 V	3時間 側管1		○
RP12	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL		1 袋 1 キット	30分 側管2		○
RP13	生食50ml デキサメタゾン注射液1.65mg		1 本 1 A	100mL/hr 側管2		○
RP14	セファランチン注10mg		1 A	動注30分前		○
RP15	シスプラチン注	50 mg		動注 10分かけて緩徐に		○
RP16	チオ硫酸ナトリウム注射液2g		3 V	アンギオ室持参。 シスプラチン動注後、 緩徐に静注		○
RP17	ソルデム3A輸液500ml ファモチジン注射液20mg		1 袋 1 A	3時間 メイン		○
RP18	マンニトール注射液[20%] 300ml チオ硫酸ナトリウム注射液2g		1 本 1 V	3時間 側管1		○
RP19	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL		1 袋 1 キット	30分 側管2		○

1週間ごと

(2) CTP (CDDP100mg)		投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2
RP1	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL	1 袋	1 キット	30分 メイン	○	
RP2	パロノセトロン点滴注バッグ 0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 A 1 A 1 瓶		30分 メイン 10:00~10:30	○	
RP3	セファランチン注10mg	1 A		ドセタキセル開始前に静注 10:30	○	
RP4	ソルデム3A輸液200ml ドセタキセル点滴静注	1 袋 30 mg/ml		1時間 メイン	○	
RP5	ソルデム3A輸液500ml	1 袋		5時間 メイン 11:30~16:00	○	
RP6	ソルデム3A輸液200ml ペプロマイシン注	1 袋 10 mg/ml		1時間 メイン	○	
RP7	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL	1 袋 1 キット		30分 側管1	○	
RP8	ソルデム3A輸液500ml	1 袋		9時間 メイン 17:00~2:00	○	
RP9	ソルデム3A輸液500ml	1 袋		9時間 メイン 2:00~10:00		○
RP10	ソルデム3A輸液500ml ファモチジン注射液20mg	1 袋 1 A		3時間 メイン 10:00~13:00		○
RP11	マンニトール注射液[20%] 300ml チオ硫酸ナトリウム注射液2g	1 本 1 V		3時間 側管1		○
RP12	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL	1 袋 1 キット		30分 側管2		○
RP13	生食50ml デキサメタゾン注射液1.65mg	1 本 1 A		100mL/hr 側管2		○
RP14	セファランチン注10mg	1 A		動注30分前		○
RP15	シスプラチン注	100 mg		動注 10分かけて緩徐に		○
RP16	チオ硫酸ナトリウム注射液2g	3 V		アンギオ室持参。 シスプラチン動注後、 緩徐に静注		○
RP17	ソルデム3A輸液500ml ファモチジン注射液20mg	1 袋 1 A		3時間 メイン		○
RP18	マンニトール注射液[20%] 300ml チオ硫酸ナトリウム注射液2g	1 本 1 V		3時間 側管1		○
RP19	ホスホマイシン静注用2g 生食溶解液キットH100mL	1 袋 1 キット		30分 側管2		○

1週間ごと

(3) シスプラチン+放射線併用		投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	パロノセトロン点滴注バッグ 0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 3 A 1 瓶		30分		○			
RP2	生食100ml デキサメタゾン注射液3.3mg	1 本 2 A		200mL/hr			○	○	○
RP3	マンニトール注射液[20%] 300ml	1 本		1時間		○			
RP4	生食500ml シスプラチン注	1 袋 80 mg/ml		2時間		○			
RP5	生食100ml 硫酸mg補正液1mEq/ml 20ml	1 本 8 ml		1時間		○			
RP6	ラクテック注500ml	1 袋		6時間	○	○	○		
RP7	ソルデム3A輸液500ml	1 袋		6時間	○	○	○		
RP8	ラクテック注500ml	1 袋		6時間	○	○	○		
RP9	ソルデム3A輸液500ml	1 袋		6時間	○	○	○		

3週間ごと

(4) セツキシマブ+放射線併用 (初回)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本		
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A	30分	○
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg		1 A		
RP2	セツキシマブ注射液	400 mg/㎡		2時間	○
	生食250ml		1 袋		
RP3	生食50ml		1 本	フラッシュ	○

1週間ごと

(5) セツキシマブ+放射線併用 (2回目以降)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本		
	デキサメタゾン注射液3.3mg		2 A	30分	○
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg		1 A		
RP2	セツキシマブ注射液	250 mg/㎡		2時間	○
	生食250ml		1 袋		
RP3	生食50ml		1 本	フラッシュ	○

1週間ごと

(6) バクリタキセル+セツキシマブ (初回)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本		
	デキサメタゾン注射液3.3mg		3 A		
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg		1 A	全開	○
	ファモチジン注射液20mg		1 A		
RP2	生食250ml		1 袋	2時間	○
	セツキシマブ注射液	400 mg/㎡			
RP3	生食50ml		1 本	フラッシュ	○
RP4	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	30分	○
RP5	生食250ml		1 袋	1時間	○
	バクリタキセル注	80 mg/㎡		インラインフィルター使用	
RP6	生食50ml		1 本	フラッシュ	○

1週間ごと

(7) バクリタキセル+セツキシマブ (2回目以降)					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本		
	デキサメタゾン注射液3.3mg		3 A		
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg		1 A	全開	○
	ファモチジン注射液20mg		1 A		
RP2	生食250ml		1 袋	1時間	○
	セツキシマブ注射液	250 mg/㎡			
RP3	生食50ml		1 本	フラッシュ	○
RP4	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	30分	○
RP5	生食250ml		1 袋	1時間	○
	バクリタキセル注	80 mg/㎡		インラインフィルター使用	
RP6	生食50ml		1 本	フラッシュ	○

1週間ごと

(8) ペムプロリズマブ					
	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本	ルート確保・フラッシュ	○
RP2	生食100ml		1 本	30分	○
	ペムプロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml		1 本	フラッシュ	○

3週間ごと

(9) ペムブロリズマブ+フルオロウラシル+カルボプラチン

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4
RP1	生食50ml		1本	フラッシュ	○			
RP2	生食100ml		1本	30分	○			
	ペムブロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用				
RP3	生食50ml		1本	フラッシュ	○			
RP4	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg		1袋					
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A		30分	○			
	アロカリス点滴静注235mg		1瓶					
RP5	生食250ml		1袋	1時間	○			
	カルボプラチン注射液	5 AUC						
RP6	生食50ml		1本	フラッシュ	○			
RP7	ソルデム3A輸液500ml		1袋	持続	○	○	○	○
	フルオロウラシル	1000 mg/m ²						

3週間ごと

(10) ペムブロリズマブ+フルオロウラシル+シスプラチン

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	生食50ml		1本	フラッシュ		○			
RP2	生食100ml		1本	30分		○			
	ペムブロリズマブ点滴静注	200 mg		インラインフィルター使用					
RP3	生食50ml		A	フラッシュ		○			
RP4	アプレピタント点滴静注用150mg		1瓶	30分		○			
	生食250ml		1袋						
RP5	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg		1袋	30分		○			
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A							
RP6	ソルデム3A輸液500ml		1袋	2時間		○			
	硫酸mg補正液1mEq/ml 20ml		8 ml						
RP7	マンニトール注射液[20%] 300ml		1瓶	1時間		○			
RP8	生食500ml		1袋	2時間		○			
	シスプラチン注	100 mg/m ²							
RP9	ソルデム3A輸液500ml		1袋	24時間		○	○	○	○
	フルオロウラシル	1000 mg/m ²							
RP10	ソルデム3A輸液500ml		1袋	2時間		○	○	○	○
RP11	フィジオ140輸液500ml		1袋	2時間		○	○	○	○
RP12	ソルデム3A輸液500ml		1袋	2時間	○				
RP13	フィジオ140輸液500ml		1袋	2時間	○				
RP14	ソルデム3A輸液500ml		1袋	2時間	○				
RP15	フィジオ140輸液500ml		1袋	2時間	○				

3週間ごと