

その他

悪性胸膜中皮腫

- (1) ニボルマブ

骨・軟部腫瘍

- (2) ドキソルビシン
- (3) AI (ドキソルビシン+イホスファミド)

絨毛性疾患

- (4) アクチノマイシンD
- (5) メトトレキサート
- (6) メトトレキサート+ホリナートカルシウム

子宮肉腫

- (7) イホスファミド

原発不明がん

- (8) TC (パクリタキセル+カルボプラチン)

(1) ニボルマブ

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	生食50ml		1 本	フラッシュ	○
RP2	生食100ml		1 本	30分	○
	ニボルマブ点滴静注	240 mg		インラインフィルター使用	
RP3	生食50ml		1 本	フラッシュ	○

2週間ごと

(2) ドキソルピシン

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋	15分	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A			
RP2	生食50ml		1 本	全開	○
	ドキソルピシン塩酸塩注射	60 mg/m ²			
RP3	生食50ml		1 本	全開	○

3週間ごと

(3) AI

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
RP1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ		1 袋								
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A		30分	○	○	○	○	○		
	アロカリス点滴静注235mg	1 瓶									
RP2	生食50ml		1 本	15分						○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A									
RP3	生食100ml		1 本	30分	○	○	○	○	○		
	メスナ注100mg	400 mg									
RP4	生食500ml		1 袋	4時間	○	○	○	○	○		
	イホスファミド	2000 mg/m ²									
RP5	生食100ml		1 本	30分	○	○	○	○	○		
	メスナ注100mg	400 mg									
RP6	生食100ml		1 本	2時間	○	○					
	ドキソルピシン塩酸塩注射	30 mg/m ²									
RP7	生食100ml		1 本	30分	○	○	○	○	○		
	メスナ注100mg	400 mg									

3週間ごと

(4) アクチノマイシンD

	薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	5%ブドウ糖液500ml		1 本	2時間	○	○	○	○	○
RP2	注射用水5mL	1.1 ml							
	アクチノマイシンD静注用	0.01 mg/kg		側管より投与	○	○	○	○	○
	生食20ml		1 本						

2週間ごと

(5) メトトレキサート

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5
RP1	メトトレキサート注射用	0.4 mg/kg	筋注	○	○	○	○	○
	注射用水5mL	2 ml						

2週間毎

(6) メトトレキサート+ホリナートカルシウム

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day8	day9
RP1	メトトレキサート注射用	1 mg/kg	筋注	○		○		○		○	
	注射用水5mL	2 ml									
経口	ホリナートカルシウム	5 mg			○		○		○		○

2週間毎

(7) イホスファミド

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
RP1	生食500ml	1	袋 24時間	○	○	○	○	○		
RP2	ヴィーンD注500ml	1	袋 2時間、側管より	○	○	○	○	○		
RP3	ヴィーンD注500ml	1	袋 2時間、側管より	○	○	○	○	○		
RP4	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	1	袋	○	○	○	○	○		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3	A 30分、側管より							
RP5	生食100ml	1	本	○	○	○	○	○		
	ウロミテキサン注	300	mg/ml 30分、側管より							
RP6	生食500ml	1	本	○	○	○	○	○		
	イホスファミド注射用	1500	mg/ml 4時間、側管より							
RP7	生食100ml	1	本	○	○	○	○	○		
	ウロミテキサン注	300	mg/ml 30分、側管より イホスファミド 投与							
			4時間後に投与							
RP8	ソルデム3A輸液500ml	1	袋 2時間、側管より	○	○	○	○	○		
RP9	ヴィーンD注500ml	1	袋 2時間、側管より	○	○	○	○	○		
RP10	生食100ml	1	本	○	○	○	○	○		
	ウロミテキサン注	300	mg/ml 30分、側管より イホスファミド 投与							
			8時間後に投与							
RP11	生食50ml	1	本						○	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2	A 15分							

1週間ごと

(8) TC

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1	パロノセトロン点滴注バッグ0.75mg	1 袋	30分	○
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A		
	ファモチジン注射液20mg	1 A		
	アロカリス点滴静注235mg	1 瓶		
RP2	生食250ml	1 袋	3時間	○
	パクリタキセル注	175 mg/ml	インラインフィルター使用	
RP3	生食250ml	1 袋	1時間	○
	カルボプラチン注射液	6 AUC		
RP4	生食50ml	1 本	フラッシュ	○
経口	ジフェンヒドラミン錠10mg	5 錠		○

3週間ごと